D 5.3
12
m. u.
V

CIVICA
F. Ant.

BERIO

D 5.3
12
4
16 5.3

m. u.
V
3
27

CIVICA
BIBLIOTECA BERIO
F. Ant.
m. u.
V
3
27
GENOVA

BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

Convallaria majalis: Scapo nudo semicylindrico laevi; foliis ovato-lanceolatis, floribus racemosis unilateralibus nutantibus. Wl. Fl. ver. t. 1. f. 441.

Florey. maj. Jun.

Floret in umbrosis sylvis. Aprili. Floret in hortis, ubi ob florum fragrantiam excolitur. 4

Obs. Folia calce commixta et macerata viridem colorem pulcherrimum praebent. Wl. l. c.

Ital°. Mughetto. Genovese Mughetto, Lillin.

Male dipegnato

Croyacolum majus: Caule decumbente, foliis subrotundis, peltatis, repandis; petalis obtusis. Sl. Jl. ver. t. 1. p. 492.

Flores aurantiaci: aestate, et autumno.

Nascitur in Peruviano regno, sed in hortis excolitur ad ornamentum. ☉

Tota planta acris et acida laudatur uti antiscorbutica. Flores immaturi sicuti Capparum flores et fructus muria vel aceto asservati gratum condimentum praebent.

Ital: Astagie, Cappuccina, Cardamindo, Nasturgio indiano
Offic. Herba Nasturtii indici
Genovese Cappusine

Syringa persica: foliis lanceolatis. Will. 1, 3, Pers. 40, 3.

Flores april. et aestate.

ex oriente allata, et in hortis colitur ~~flore tot~~ ob suavem florum odorem. ħ.

Genovefa Sicomoro.

Vicia bithynica Linn. sp. 1038. all. fl. Ped. t. 1. f. 321. t. 26. f. 2.
Savi fl. Pis. t. 2. f. 191.

V. Caulibus bi-trijugis ellipsico-lanceolatis, apice stipulis dentatis, leguminibus pedunculatis solitariis erectis scabris.

Flores april. maj.

Semina in collibus ejus vallis S.ti Bartholomei. ⊙

F 2.

F 1.

Orchis bulbis subrotundis, foliis non maculatis, [illegible]
vato-lanceolatis, spica laxa, petalis acutiusculis, exterioribus
flexis, labello trilobo denticulato, cornu conico obtuso germi-
bus brevioribus. Fl. aprili. Genuae prope Granarolo

5

Orchij maculata: Foliij lanceolato-oblongij, labello trilobo obtuso
subcrenato, lobo medio longiori emarginato, petalij exterioribus
reflexij, cornu obtuso horizontali germinij longitudine.

Flor. aprili- majo.

Genus in collibus prope Granarolo. 4.

obs. variat Foliij punctatij, et Foliij fasciatij.

Orchij bracteatij vivian. annal. Bot. p. 184.

Fl. aprili nigr. Foliij maculatij

Pulmonaria Angustifolia Decand. fyn. pl. n. 2720. = foliis radicalibus lanceolatis, scabriusculis. —

~~Pulmonaria~~ foliis radicalibus ovato-cordatis, scabris; caulinis ovatis, sessilibus calycibus longitudine tubi corollae. Rth. Fl. ver. t. 1. p. 204. Pulmonaria officinalis

Flores coerulei vel purpurascentes. Folia albo-maculata; sed datur varietas foliis immaculatis; Martio et aprile et tota aestate.

In declivitatibus collium et ad sepes umbrosas. 4.

ad affectus pulmonum, sanguinis expuitionem, phthisim, etc. utilem esse olim perhibebatur. Rth. l. c.

Helleborus viridis. Scapo aphyllo subbifloro bracteato, foliis palmatis, foliolis oblongis acutis serratis glaberrimis coriaceis. Fl. Jt. ver. f. v.
Elleboro nero.

Flores virides, interdum subtus leviter rubri.

Genus in collibus prope Granardo.

Obs. Helleborus niger Hippocratis sive Helleborus niger seu Melampodium Plinii non est noster sed Helleborus orientalis Willd. sp. 2. p. 1337. species media inter H. nigrum, et H. viridem. Vide &c.

Tulipa Clusiana: Caule uniflore glabro, petalis glabris, tribus exte-
-rioribus acutis, tribus interioribus obtusis, Filamentis glabris Dilatat
Lois. Fl. fall. t.12.f.724. ... Tulipano del Clusio.

Obs. Petala omnia latitudine aequalia nec alternatim latiora

martii. agunt. Floret.

Genuæ in albaro, et inter Segetes prope Savonam vulgatissima 4.

Ital: Le Genovese Bolipano. Verpianetto.

β andromeda polifolia: pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. Roi. Fl. Gall. t. 1. f. 237.

Fl. agosto

Genuae in Hortis culta. Habitat in turfosis uliginosis circa Rothomagum Roi. l. c. tf.

Erica fascicularis

1 Glandole anteriore alla base dell'antera
2 Ilum del labello
3 prominenze del labello sensibili
4 macchie lucide descriventi cuor H

10

rabiva

ophis arachnites
Pathicus?

Festrum Lipsiae

Aegilops ovata L.

Berberis vulgaris L.
Equiv vignetta f.
Crespino matth. p 125

Fraxinus Ornus sp.pl. 1510.

Fraxinus ornus L.

Carex digitata L.

Hedysarum Caput-galli Linn.

B
A

Perpetua Imperii?

2

1

3

1 Ophryj Bertoloni Moretti Giornal. fisic. chimic. t6. f. 145

1 Ophryj speculiqua Lin.

3. Ophryj lutea fl. april. maj. sequen. aggredit prope Lin. Bernardi

2 Ophryj fuyca cum precedent. Caule foliisq. labello oblongo trilobo lobo medio majore emarginato, lateralib. ut
n. 3 cum flore dilutiore canaliculato ut precedentij. labello maculato oblongo elliptico glabro ut in Ophryj n. 3.

Orobanche major Linn?

tyrimo

Jasminum fruticans. Lit. t. 1. f. 20

F. I.ª

F. seconda

F. 2.ª

1. fiore veduto lateralmente
2 . . . . . dalla parte superiore
3 . . . . . dalla parte inferiore
4 . . . . . con i tre petali esterni rivoltati

22

f 1ª Orchis ustulata L.

f 2ª Orchis tephrosanthos Vill. t 3. f II. O. militaris E. Linn. sp. 1334.

Iris graminea L.

Luzula albida DeCand. Bauny L.

E. 1

F. 2.

f. 1. Centaurea montana Linn.

f. 2 Crepis nicaeensis?

f. 2. Barkhausia setosa B. Candolle ~~sub-pygmaea~~ sub-inermis, pedunculis calicibusque pilosо-glandulosis.

f. subtus ad axeugyba. - Foliis ovatis dentatis

f. Eni crebbe colla forza della Crepis setosa Hall. ma non ha il calice ispido, ed i peli sono forse glandolosi

Veronica latifolia Bro: V. urticifolia β Linn.?

Zawiedlin pierwszy L.

Le riparò

Thalictrum aquilegifolium L.

B
A

Vide calcaria A

Ceraptium trunticum L B

A . . . . .

B . . . . . .

. . . . C

Saxifraga cuneifolia L. fig A

Pinguicula grandiflora Lam. fig B

Senecio rondifolius fig. C

1 . . .

. . . . B

. . . . A

82

Stamina 10 — Styli. 2. f. B.



f. A Linnæus Campanulatarum L.
f. B Moehringia muscosa

A
B
C.

† A Eriophorum angustifolium L.
† B Daphne Cneorum L.
† C Veronica Montana L.


Helianthemum guttatum Vill. Cistus L.

... A

..... B


B
Agrostis Sesamoides L.
Plantago maritima L.

A
B

Linnæus augustissimus Lois

Nardus stricta

A . . . .

. . . . Б

A Bisculella Laevigata Linn.

B Ligustrum vulgare. Linn. . Fl. majo. Junio. alli acquagola

E 1

F 2

E 3

E

a fiore intero al naturale
b calice idem
C uno dei due stami idem
D fiore ingrandito
E una delle due piccole
foglie della corolla

F. 1. Salvia bicolor. foliis radicalibus cordatis subtriplicatis, caulinis oblongis subsagittatis inaequaliter dentatis, bracteis reflexis calyce brevioribus, foliis calycis glandulifersis. Will.

Pianta perenne che cresce spontanea nella barberia, da noi nei giardini si vede non rara essa produce molti fusti 2-3-pedali tetragoni pelosi con alcuni peli glandolosi, le foglie inferiori picciolate ovate dentate subcarnose rugosissime, i superiori sessili; i fiori cerulei chiari colla laciniaa media del labbro bianchissima concava, e 2-lobata, sessili sono grandi, piegati disposti assai assi in verticilli approssimati; stilo lunghissimo – I peli del calice sono glandolosi ad eccezione di alcuni più lunghi che terminano in punta, siccome quelli del Caule fiorisce da noi in Giugno.

male

f 2 Salvia clapifolia Bergamaschi. Giornale chimfisica Brugnatelli tom 7 f. 214

f 3 Salvia verticillata L. nell'giug. del 1831 all'acquasola trovai questa Salvia con foglie tutte auriculate comprese le due ultime; come si vede dalla figura N° 3. che vi è marcata la figura di una foglia delle penultime che si trovano alla sommità del caule

A
B

ilum

Cerastium compressatum Vivian. f. A

Iberis umbellata f. B.

male

Eg. bbiens angustissimum L.

idem

a Nymphaea alba L.

f1 Scrophularia Peregrina nel giardino dell'ospedaletto fiori in aprile

f2 Chondrilla Juncea

~~Leucanthe~~ ~~ramosissima? Lobelii fl. Gall. t 2 p. 512~~

in margine agrorum

Scabiosa Lucantha

386.

1

2.

Aconitum paniculatum Lam.



mate

Lactuca Saligna Linn.

Passerina hirsuta

Plantago media

391.

Hannibal Hippolyte

Asperula Cynanchica

A

B

Sokolska Grazyna l. 4 A

Cejtsey monipulacyj l. 4 B

Burnias Eakite

Geum urbanum

Saxifraga Granulata

Saxifraga granulata L.

F 1.

F 3

F 2

57

F. 1. Galanthus nivalis.
F. 2. Saxifraga tridactyles. giovine appena in fiore
F. 3. pianta adulta
F. 4. configurazione dei Petali

Galanthus nivalis L. f. 1.
Saxifraga tridactylites L. f. 2. 3



H. Maborw. fecit & dny L.

mala

Hanemone hortenjij

anemone Hepatica L.

399.

400

401

399.

400

60

atropa Belladonna L.

Erythronium Dens canis L.

607

Prunus Laurocerasus L.

accr opentissimum Decumb

Globularia vulgaris

406.

65

Ida

Thlaspi perfoliatum Roth. Flor. ver. Cakile Linn.

Scandix Pecten Veneris L.

A



B.

Polygala vulgaris J. B.
Euphorbia ~~Cyparissias~~ Cyparissoides

1
2
4
4
1

Cytisus Laburnum L.

Geranium macrorhizum L

~~Angelica~~

Athamanta Cordensata? questa pianta mi venne favorita dal Dottor Delle Celle del Istituto di Pisa
il quale l'ebbe dal Sig.r Piuma - questa ~~pianta~~ nacque nel Giardino adiacente
alla sua abitazione nella Strada della pace, e dice potersi essere una semente
avuta da persone che ne avevano portate molte dall'Africa

412.

71

Echium violaceum? Linn.

Echium [illegible]

413 --

72

Hammenby Acrisf. Bj. B. Alin.

Bogen Lumpensammler 81

F. 1

F. 2.

1. Thalictrum lucidum Linn. sp. 770.
Flavum Linn. sp. 770.
2.

1.

Thymus Vulgaris Fl.



Vicia Ervilia fol.

Hammerbury Collegium B 81



78

A Labbro staccato
B una delle sue lacinie più grandi, fra le cinque che compongono la parte superiore del fiore

Orchis papilionacea Bert.

asparagus hispida Ait. ed 2. p. 565. Leontodon Burtol.

A
B

A. Rubia peregrina Fl. Fl ver.
B. Herminia hirta Fl. Fl. ver. t. 2. f. 605. Bertol. amoen. Leontodon. Linn. Picris. allion.

A

B

F.A. Hieracium Pilosella? /
Receptaculum nudum
F.B. Hieracium Florentinum β Pollin H ver
N° 1 Receptaculum villosum

424

Hypserij cretica Vill. annal. bot. 1 ff. 2 f. 174. Rhagadiolus hedypnois Gtt. t. 2 f. 605. allion. 1 ff. 226.
H. Hedypnois Linn. H. rhagadioloides Bertol. pl. Gen. n°. 237. —

1
2
3

f. 1. Matricaria Parthenium Linn. fl. 1255.

f. 2. ~~Matricaria [illegible]~~. Chrysanth. maj: all'acquaforte.

f. 3. Anthemis Austriaca Jacq.

Santolina chamæ-cyparissus. Linn. sp. 1179

427.

2 filamenti dei stami primi
1 stili primi.

86

Clematis integrifolia Vit. Summ. pl. t. 3 f. 353.

F 2

A

Solanum Dulcamara

f. 2. Lycoperdon Carpobolus . . volva multifida, fructo globoso seminibus subrotundis albicantibus, matura fulvo pulverulento

fungo manjabile = trovato sui colli di Olevano in autunno. 1834.

F. 2.

F. 1.

f 113 Lotus corniculatus. Caule erecto-ascendente pluribus-que laxe-diffuso-lineari-bus glabriusculis, capitulis paucifloris.

Fl. Jun. Jul. locis siccis et collinis propre pontem divi Bartolom. secus aquaeductum

F. 1.
F. 2. Lotus corniculatus β

Lotus corniculatus? Varietat. forsan in Maggio Giugno si trova all'acquedotto, e sui terrapieni del Gabbro.

Lo stesso l'primo alla marina di Livorno può andare a Becca d'oglio, ed è comune sotto le Cerbine per andare ove sono le sorgenti dell'acqua dotta

F. 3.

F. 1.

F. 4.

F. 2.

Lepiota

f. 1 Tuber Cibarium. Lycoperdon Tuber. Linn.

f. 2 Agaricus (Lepiota) clavatus Pl. tom. 3. f. 692

f. 3 agaricus (Gymnopus) confluens?

f. 4.

A . . .

Pistacia lentiscus Linn. Sw. rollibg. ubique

F. 1



F. 5

F. 2.

F. 3.

F. 4.

Fig. 1 Agaricus campestris

f. 3

f. 4

f. 2 Agaricus elongatus? Pill

B
A

B. ordin. Sambucina flor. aprili. maj. agli angioli ejus memoria.
A. ordin. provincialis. fl. id. festis junij

1

2

Sesleria Seriopica. questa Seriopica è vicinissima a quella descritta dal prof. Viviani, e che chiamò triloba
pare differisca nel avere il labbro intero crenato ai due lati, coi margini undolati, l'esemplare lo diede
al professore Viviani
l'ho ritrovata alla mattina dei 4 maggio in Arezzo sull'monte ove era il Telegrafo.

436

95

Hyacinthus monstruosus? Linn.

Fiorito Aprile presso Pisa Francesco in albaro in una prato boschivo nella villa [illegible] prima del canneto.

P.e

5ª Orchis fusca Poll. ft ou t 3. p. 13.

1 labelle veduta inferiormente
2 3 lacinie esterne vedute di fronte, con il germe che le so
3 fiore intero veduto in prospetto a cui le 2 lacinie interne
4 4 4 fiore vedute sempre lateralmente
5 Stilo 2. b antera. c Corno. d. Germe. e labelle
tutto veduto alla lente

2 Orchis Morio Linn.
3 Orchis fusca Sibth.

Convolvulus althaeoides Linn. sp. 222.



andropogon Distachyon

.... 2.

.... 1.

Gentiana acaulis. Linn.

Crinitum ? Hemerocallidem L. Plin.

fl. maj. in alveo ad Bridgetown prope it. Barbado.

Iris Xiphioides

A fiore al naturale
B " ingrandito colla lente
C germe idem
D petalo idem
E stame idem
F fiore non ancora appertо idem
G foglie coi bordi rivoltati idem
H " altre foglie idem

102

Frankenia pulverulenta.

Folijs revolutis, ovatis, subtus pulverulentis. ♃. maj. jun.

A.
B.
C.

108

Saxifraga Aizoon.

Ophioglossum Vulgatum L. Linn.

1

2

trovata a Sestri di ponente in maggio—

2. Silene Gallica L. alla Magnosa nel maggio del 1831.

A

A Petalo visto colla lente

105

Saponaria Ocymoides Linn. sp. 585. in plevera

Crucianella angustifolia L

prope marazzi fl. Junio.

1. Floretto al naturale
2. Seme col pappo al naturale.
3 Floretto visto alla lente. – Seme col pappo



Crepis foetida Bertol.

Prajo ettaragni Sumio. flor. et all'agnolo vulgarissima nell'alveo del Brizagno

Lychnis Sylvestris Decandol.

Habit. prope Carnegie in declivitatib. coll. flor. Dun. Sub.

451.

Satyrium albidum L. antera

Orchis alb. Da. dal.

Habitat prop. anteras cum Satyrium nigrum Jt. Sun. Julio.

male



Senecio Doria montobbio

I

a

b b b

II

a Ligula del Raggio al naturale
b b b idem, sfogliato, e parzialm ingrandite

Agrion Puella Vossig. fam. Etrus. t. 2. f. 120.

I – Libellula Puella Linn.

F. I Bupthalmum Salicifolium Linn. fl. Gall. t. 2. p. 261 in montib.

Aethusa Cynapium Linn. negli orti

A . . .

B . .

. . . 1.

1. Fiore a calice ingrandito colla lente.

114

Erigeron graveolens L. nelli aloco del Bisagno al ponte rotto fior. Settembre

formentilla erecta luogo detto terralba fior. in Settembre

A fiore ingrandito colla lente
B idem il seme

115

β Hieracium prenanthoides Vill.
H. (cidoniaefolium) Vill. Dauph. 3. p. 107. Sotto S. Vicla luogo sotto terrabba fiori in autunno

Picris Hieracioides Linn III 5
Wahlb. sp. 3 p. 1557
Hieracium [illegible] Linn. sp. pl. 1130.
Crepis Sprengeriana Schlon. Fl. Lud. n. 810.
pilis furcatis.

C.
B
A

Gentiana Ciliata Linn. vicino il castello di Montobbio fior. agosto citr. et alte variat caule multiflora

Irej Sisyrinchium.

avuta nell' 1878. ai primi di Maggio - prega nella proprietà dell' Agnella

Gentiana Campestris. prope Montobbio. Fl. maj. Jun. Variat caule humiliori et capitosi.

460

119

A fiore di naturale
B Germe idem
C.D.E.F.G fiore intero. fiore con calice aperto, F corolla aperta, Germe
vedute alla lente

Erythraea intermedia Schw. t. 1. f. 250

Chironia intermedia
Chironia ramosissima Lam. C. centaurium β. Wild.
Gentiana Centaurium β Linn. sp. f. 333.

nei fossi sotto la spiaggia dello Zerbino luogo paludoso fior. in agosto settembre. rara

D

A

B

C

1 Petalo del Linum
2 Flore dell'Helleborus

120

Linum Gallicum ☉ Julio all'acquajola Inverni, et prope ædes Bartholomei extra moenia

C. chlora perfoliata, pianta autunnale -

D pianta d'estate nei luoghi erbidi

F. 1.

F. 2.

f. R. Linum maritimum L.
f. l. Linum Gallicum

f. 1.

f. 2

122

a porzione del Lycopodio ingrandito, e Veduto tanto al Rovescio, che al Dritto, come al Disopra f. 1

y calice, e corolla apparte ingranditi. f. 2

δ Semi = E. calice, e fiore intero al naturale

1 Lycopodium denticulatum? Linn.

2 Clinopodium vulgare Swand.

Ulex europaeus all'acquaio dalla Sorgente dell'acqua cum Lytrisy trifloray

Cerastium Latipaniculatum all'isquyda ove il lago. fior. aprile magg.

1 fiore ingrandito
2 seme id
3 altro fiore in mezzo alle foglie che comincia ad
a a a a decidersi spacca di sotto
che cresce sopra molte euphorbia

125

A Geranium tuberosum propre Terralba fl. albentibus

B Euphorbia exigua

F. 1.

F. 2

F 1

F. 2

f. 1 Cytisus Sessilifolius Linn.

f. 2 Fedia Dentata

a
b
c
d. 128

f. 2 Orchis provincialis Folia Bart O. fuliginosa β Bertol pl. gen. p. 120. O. morio β. Linn.
f. 1 Neottia Spiralis Sw. Ophrys Linn fl. Sept. oct. in collib. ubique.

1.

2.

1. Serapias cordigera
2. Serapias Lingua } simili individui si trovano comunemente altrove verso la metà di maggio. —

Oss.ne Se si eccettua la statura io non trovo differenza tra queste e quelle descritte dal Sig Bertoloni

. . . . . 1.

. . . . 2.

1. Cerastium ~~Cerastium~~ Dioïcum. fl. apr. maj in Capenardo — Habitat ennaphroditis

Cerastium Strictum Linn. Calyx pentaphyllus* Petala 5. bifida marginata. Capsula rotunda. Stamina 10. Styli 5.
*Foliola ovata, acuta, viridia, glabra, margine membranacea.

all'agrazdon flor. maj jun. proprie Baldi. anno Cerastium Campanulatum

472.

a corolla sfacciata
b fiore col calice

131

Lithospermum Purpureo-caeruleum Linn.

Carex pendula
maxima Scopoli

Dentaria pinnata Schm. Hierac. t. ij p. 404.

Daphne Laureola

476.

F 1 .....

a

F 2.

a una porzione di foglia ingrandita colla lente

135.



fig 1. Gratiola officinalis L.

fig 2. Centaurea Crupina L.

a Sezione transversale del fiore



Pyrethrum Corymbosum Bertol. amoenit. Italic. p. 193

~~Chrysanthemum corymbosum~~ ~~Bert. fl. gen. p. 114.~~

~~— p. 193. fl. maj et Junio Genua~~

ad Lagaj 10.

478.

137.

Bryonia dioica.

22. Fiori, e pappo al naturale
III. Fiori, e seme col pappo ingranditi colla lente
a floscolo del disco
b floscolo del centro

138

Crepis Leontodontoides? all. auct. fl. Ped.
Scorzonera laciniata?

480.-

a fiore con dietro un altro non ancora
b detto ingrandito simile simile

139

f. 1 Bromus erectus Bartol. Fl. [illegible]. inm. hil communis Genus loci gramineis

erectus

erectus Smith. vivian. fl. Ital.

asperi Allioni fl. ped. 2. p. 249.

f. 2. Polypogon monspeliensis &c

481.

a fiore
b Detto ingrandito

140

Bromus madritensis Linn. sp. 114
Diandria Smith. Icon.

a Flosculo al naturale del Disco
b Detto ingrandito idem
c Dente del centro non ancora apparito ingrandito
d pagliza che alternano i flosculi ingrandita
EE Semi col pappo piumoso ingranditi

IHI

Hypochaeris radicata Linn. Sp 1140. fl. maj. Sum. Sulz. alt. aequyola

a fiore intero al naturale
b. calice con stami id
c una delle ale id.
d. Legume id

183

Astragalus Glycyphyllos propre Montoffio. Fl. maj. Jun. et in cavitibus propre l'acqua santa

Oxytropis pilosa Decand n. 3958.

a fiore ingrandito veduto posteriormente
b detto veduto anteriormente

143

Spiraea Aruncus L. propè Montebbio Fl. maj. Jun.

F. 1

F 2

a Ligula con sei nervi quattro di essi più prominenti
b Seme col pappo ingrandito
c. detto al naturale

f. 1. Tragopogon Pratense Linn. alis acuminatis fl. Julio.
f. 2 Tragopogon pratense β Linn. foliis undulatis

a corolla rotata
b fines id calicis
c calix
d fructus

145

~~Lysimachia vulgaris~~ flor. Jun. Jul. ~~in humidis~~ in montib. prope montebio Turaynag.

Lysimachia punctata Linn. sp. 220.

F 2

F 1

K
y
x

a fiore
b detto ingrandito

146

t. 1. agrostis vulgaris b
t. 2 Bromus arvensis

488.

F. 1

F. 2

xx prima della fioritura

a calice con due fiori ingrandito colla lente

b lacinia esterna della corolla maggiore munita d'altra arjstata

c lacinia interna della corolla

d stami

e pistillo

1. fiore al naturale

2. calice con due fiori ingrandito

2. lacinia esterna della corolla arjstata

147

Arrhenantherum avenaceum Bertl.
flor. Italic. p. 484 Lecis tab. 10 f. 4.

f 2

a calice
b fiore
c spica
d fiore ingrandito

148

Bromus secalinus B Berl. Fl. Stal. tom. 1. p. 655.

a calice con fiore bifloro
b fiore aperto

149

F. B

F. A

a a

a a fiori ingranditi

150



A. Digitaria sanguinalis Scop. Panicum sanguinale Linn.

B. Digitaria ciliaris

A

B

a b c

a fiore
b Seme
c brattea

151

f. 1 Astrantia maior Linn sp. 340. fl. Jun - prop. il sagello

f. 2 Melampyrum Sylvaticum Linn sp. 843. fl. Jun. ide

a Fiore intero al naturale
b detto ingrandito
c calice con stami riuniti alla sommità Idem
d detto ed lo stigma Idem

152

Jasione montana Linn. Sp. 1317. Fl. Jun. prop. d Sojetta cum Vaccinium Myrtillus

a

A

B

a Petalo al naturale

153

Epilobium parviflorum ht. A. 1. p. 495.
pubescens Willd.
Stachys annua Linn. sp. 813.

F 1

a

z y

& d

F. 2.

z flosculo intero
y pappo
& d. flosculo, e pappo ingranditi

a flosculo al naturale

154

f. 1. Carduus pycnocephalus Pall. 1. 2 p. 627.

f. 2. Carduus tenuiflorus.

a fiore al naturale
b Detto ingrandito
c spica al naturale
d. Seme ingrandito

155



Schoenus mucronatus Linn. sp. 63.

a corolla ingrandita
b seme ingrandito

Fig. 1. Lythrum Salicaria Linn. fl. Suec. progr. Dieci Bartolomei di Stoghiene
si trova con quattro foglie, e talvolta con due opposte soltanto, ed anche con foglie alterne.

2. Calicij assenji ecc.

a petalo al naturale
b Corolla col calice ingranditi
c Stigma quadripartito id.

a fiori ingranditi

157

1. Epilobium molle Decand Synopsis # 3664. Fl. Jul. } in montibus prope la Guardia
2. Dianthus furcatus Decand. Synopsis # 4320 Fl. Jul }
3 Chenopodium polyspermum? Linn. inter segetes Fl. Jul. cum Epilobium, et Dianthus.

a Lacinia del calice ingrandita
b filamento al naturale
c Pistillo ingrandito

158

Cardamine crispata
Hab. ad vias, et fossas vulgaris
fl. any. Jul.

aa semi ingranditi
b Involucri sollevati id.

159

ammi Visnaga
fl. jul. in agris

301.

a corolla indurata
b fructus idem

160



Ammi Glaucifolium

302

F. 1

F 2

161

a calice
b calice con tutti i fiori che compongono la spica
c fiore ingrandito
d lacinia interna della corolla sfrangiata, e ingrandita

f1 fastuca durisculus? ff. aspriusculi

f2 fastuca ovina?

~~di [illegible] Durissimi~~ f1 varietà che fiorisce in agosto sin'a seconda fioritura

f1 all'argilla ff. f2 varietà che fiorisce in maggio sulla prima fioritura

a calice al naturale
b corolla ingrandita
c lacinia interna della corolla ripiegata ed ingrandita
d calice contenti i fiori che compongono la spica ingrandito
d detto al naturale

162

festuca. Durinscula ♃ fill. fl. v. t. p. 120 pinta Chelsea in agyto —

all. aequycla fl. aug.

a fiore ingrandito con la foglia al naturale
b Detto ingrandito
c fiore con la laciniadella corolla rivoltata id.
d stame idem
e foglia idem
g Detta avvida che si trova al principio dei rami id.

Polychaemum arvense

a Seme ingrandito

Pimpinella Saxifraga

506.



F. 2

F. 1.



a fiore al naturale
b. c. fiore, e calice ingranditi

155

f. 1. Lycopus Europaeus

f. 2. Lycopus Europaeus variété

507.

a a floscoli al naturale
b detto ingrandito

a b c floscoli, pagliia, e semee al naturale
d floscolo intero ingrandito

166

1. aster novi belgii? all'acquaio fiori Settembre, e ottobre
2. Helianthus multiflorus. idem

508.

1

2

a fiori con le aristre ingranditi colla lente

a Seme al naturale
b detto ingrandito colla lente
c fiore affatto scollato con la bifida espressa arista
d Calice ingrandito ugualmente
E fiori della grandezza naturale
2 rami perastrali o decumbenti

1 Panicum verticillatum Pl. fl. veron. t. 3. f. 208.

2 Agrostis [illegible] Lejeun. 1813 all'acquajola fiori da agosto a settembre
canina

Alsinum multiflorum Hall t. 1 f. 50 Ribaira in bilbicka

Serratula tinctoria L. fiori in agosto Settembre. varia moltissimo nella forma delle foglie

A

B.

A. Hyssopus officinalis fiori da luglio a settembre

B Melissa Calamintha fiori da giugno a settembre.



1. Erigeron acre L. flor. augst. Septemb. Variat caule recte hirto ramoso; et caule hirto scaphiosissimo.
1. Conyza racemosa L.
2. ~~Polypogon Monspeliensis~~ fl. augst. et Septemb.
2. ~~Alopecurus (pratensis) Linn. sp. 90.~~

512

171

Aira caerulea

f. 1.

f. 2

172

1. Plumbago europaea
2 Cistus fumana

a
b.

514.

a fiore ingrandito
b. Seme idem

193

fl. Cyperus fuscus. flavus Septemb.

fl. 2 Hibiscus Trionum.

a. bbb Seme reflessi al naturale
c. Lanugine del calice idem
d. Seme ingrandito.

174

Centaurea calcitrapoides

1
2

1 Digitaria sanguinalis β Cent. flor. Tab. 1. f. 415
2 Conyza squarrosa

Pastinaca sativa

F. 1

F. 2.

177



fig 1. Caulis nodosa Pollin.

fig 2. myagrum Crucaefolium

F. 1.

F 2



f. 1. Achillea tomentosa.
f. 2. Trifolium incarnatum L.

I.

2.

Calice, e fiore intiero

179

Ervum acutifolium β? Fl. Ross. appl. mai. ad aegypt. 1831.
Pisum ochroxy Linn. Lathyrus ochroxy Fl. Gall. edit. 1824

F. 1.

F. 2.

f. 1. Chrysanthemum Staticum? Lin.

f. 2 Tragopogon picroides L. pioperuna alba wilgotny. Fl. april. maj.

A calice, e corolla al naturale
B idem ingranditi colla lente in quali vedonsi i peli glandolosi
C Stami col filamento al naturale in n° di 5 con cinque filamenti sterili che gli alternano
D Lacinia del calice idem

α calice bi-floro
γ i due fiori uno colorito, e l'altro sbiadito disposti il tutto ingranditi colla lente.

181

Erodium
Ajra caryophyllea

E. 1.

α corolla al naturale

β stigma, e anthere il tutto veduto collà lente

182

F 2.

1 Ophrys Vidoy-avij lagrelami fu mandata dal Prof. Viviani il giorno 20 maggio 1831. che la raccolse sopra Spezzia

Epipactis Decand.

2 Chrysanthemum atractum

F. 1

F. 2.

1 Faëberota Bonarota fs Veronica spicata
coerulea vitm t-1 f 35

2 Dragopogon angustifolium

α flosculo della circonferenza sterile
γ. Setta del disco
φ squame del calice
A flosculo del disco ingrandito
b idem.
c pappo idem

184

Centaurea Galatitz B.

526.

185



Arum Dracunculus





Oenanthe pimpinelloides -

F. 1.

1. Saxifraga Pyramidalis Lapeyr.
2. Myrrhis Hirsuta fl. Sall 1828.

F. 1

F. 2.

a antera ingrandita
b Labello ¡Dem
c fiore veduto all'indietro ¡Dem

330



Epipactis Latifolia
2 phleum pratense

Aethusa Bupiny? H. Gabriac

1 una delle tre lacinie del calice
2 uno dei sei petali che compongono la Corolla
3 stami poliginii sormontati da un antera contorta con
Siliqua baccata stipitata 2 loculare
4 stami visti in diverse maniere coll'antera revoluta - Ingranditi
5. 6 Siliqua baccata troncata per metà, e seme il tutto ingrandito
7 seme al naturale

191

Argemone Mexicana.

a
b
c
d
x
y
z

Sanicula Europaea

F. 1

F. 2.

Leontodon saxatile Lam. Dict
Epipactis palustris

Boletus Luridus?

537.

F. 1.

196

1. arnica montana

2 Tagety

1.

2.

a b c d e

3.

a petale
b
c
d

127

1. Galium Saccharatum. All.
2. Vinca minor
3 Myagrum Pyrenaicum Lois. Sisymbrium Linn.

F. 1

F. 2

A carina
B calice con brattea } ingranditi
C brattea - D Stami }

1 Germe con quattro filamenti
2 antera
3 Squama il tutto ridotto alla metà

198



1. Lupinus hirsutus pro Div. alberti. Sistit pomum ♂ agrii
2. Eleocharis palustris Bertol. fl. Ital. Tol. 303. Scirpus Linn.

Digitalis purpurea.

. . . 1

. . . 2

1. Arabis Thaliana

2. Bojentella Hispida

F. 1. . . .

L. Stigma quadrifidum

. . . f. 2.

102

Cortinaria
Agaricus albo-brunneus. Sow. 198.

Pleurotus
agaricus dilepticus? Bull. t. 3. f. 631.
Forsch. der pilze.

Epilobium montanum B. Berlebu
2. Chenopodium Botrys

544.

1

2

3

F. A.

1

2



4

3

F. B.

203

1 -

2

A . . .

3

B

X

a

b

c

d

. . C

. . . D

1. fiore ingrandito con bractee
2 Bractea adiacente alle foglie
3 Germe a maturità ingrandito

204

△ fiore ingrandito
◻ detti appersi
ɣ germe ingrandito

i germe al naturale
d fiore ingrandito veduto esternam
c detto ingrandito colle parti interne
X fiore ingrandito colle bractee
a bractee fiorali al naturale
b id. delle foglie id.



A Polygonum maritimum Linn. sp. 519.

B. Paronychia Cymosa Decand. Illecebrum Cymosum Linn. sp. 299

C. Veronica Serpyllifolia Bastt. f. 1. p. 89.

D Thelygonum Cynocrambe Linn. sp. 1411.

BIBLIOTECA CIVICA BERIANA
GENOVA

A Poly

B. Varo

C Varo

D The

A Poly

B. Parn

C. Vari

D The

Inv. n= 829

Mod. 8

COMUNE DI GENOVA
BIBLIOTECA BERIO
N. 829

3

BIBLIOTECA CIVICA BERIO
m.r.
V
3
27
GENOVA